



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS EN CHILE, ANÁLISIS DE POBLACIÓN GENERAL, 2022. (N° 1279)

Autores: *Henríquez Hernández J. I.*¹ johannahenriquez@gmail.com ; Droguett Droguett N.²

¹ Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Mayor, Temuco, Chile

² Escuela de Salud Pública, Centro de Observación y Análisis de Datos en Salud, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Mayor, Santiago, Chile.

Introducción

El consumo de drogas ilícitas constituye un problema prioritario de salud pública en Chile por sus efectos negativos en la salud individual y colectiva. Este fenómeno, de naturaleza multifactorial, está influenciado por variables individuales, sociales y contextuales.

El presente estudio tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo sociodemográficos y contextuales asociados al consumo de marihuana, pasta base y cocaína en la población general chilena, utilizando los datos del XV Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Población General.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio transversal, analítico y correlacional. Se utilizaron datos secundarios provenientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Población General, aplicada a personas entre 12 y 65 años (n = 17.454), representando al 70% de la población nacional, gracias a factores de expansión. Se calcularon prevalencias e intervalos de confianza del 95% mediante estadística descriptiva. Se emplearon modelos de regresión logística para identificar asociaciones entre variables independientes: contextuales y sociodemográficas y variables dependientes: consumo de marihuana, pasta base y cocaína, utilizando la prueba estadística Pseudo R² de Nagelkerke. El análisis se efectuó con SPSS. El estudio fué presentado al Comité Ético Científico Institucional, Universidad Mayor, N° de Folio 0510, del 07 de Agosto del 2024.

Resultados

- Desde el punto de vista sociodemográfico, la muestra analizada (n= 17.454) presentó una alta proporción de mujeres (50,3%) y población en el grupo etario de 45 a 65 años (35,2%).
- El 42,5% de la población pertenece a un nivel socioeconómico bajo, y un 58,7% tiene un nivel educacional medio.
- El 49,7% de la población declara tener buena salud y alrededor del 30% de la población se encuentra expuesta a situaciones de riesgo desde el punto de vista contextual.
- La prevalencia de consumo de drogas ilícitas fue de: 34,7% para marihuana, 2,0% para pasta base y 6,2% para cocaína.




Gráfico N° 1: Acceso a Drogas.

- Regresión logística de consumo de drogas:

Tabla N° 1: Regresión logística, asociación de consumo de Marihuana, Pasta Base y Cocaína

Variable	Categoría	Marihuana		Pasta base		Cocaína	
		OR	IC 95%	OR	IC 95%	OR	IC 95%
Consumo de pasta base	Si	15,71	(8,48-29,13)			19,63	(14,3-26,92)
Consumo de cocaína	Si	13,58	(10,11-18,23)	20,6	(15,0-28,3)		
Consumo de marihuana	Si			26,6	(14,51-48,79)	14,46	(10,94-19,1)
Consumo de alcohol	Si	10,3	(8,67-12,23)			2,35	(1,47-3,75)
Estado de salud general	Muy malo	1,73	(1,10-2,70)	1,31	(0,71-2,38)	1,65	(1,17-2,33)
Tráfico de drogas	Mucho	1,46	(1,27-1,67)				
Consumo de drogas ilícitas	Algo					1,63	(1,23-2,15)
Sexo	Hombre	1,44	(1,31-1,57)	1,77	(1,28-2,46)	3,1	(2,54-3,79)
Nivel socio-económico	<\$300.000			3,62	(2,17-6,25)		
	\$300.000 y \$500.000					1,63	(1,17-2,27)
	>\$1.000.000	1,47	(1,29-1,66)			1,66	(1,18-2,35)
Nivel educacional	E. básica o menos			14,47	(1,85-95,0)		
	E. media o menos						
	E. profesional o más	2,66	(1,96-3,62)				

Conclusión

- Los resultados revelan un patrón de consumo complejo, influenciado tanto por factores individuales, como por condiciones sociales.
- Factores sociodemográficos como el sexo, el nivel socioeconómico y el nivel educativo son determinantes claves en la probabilidad de consumir marihuana, pasta base y/o cocaína.
- Las condiciones del entorno, como la percepción de inseguridad o el tráfico de drogas, incrementan la probabilidad de consumo, mientras que un buen estado de salud actúa como un factor protector.
- El consumo previo de otras drogas destaca como un factor de riesgo transversal, lo que evidencia dinámicas de uso múltiple.
- El consumo de marihuana se encuentra normalizado en la población ya que es considerada una droga de bajo riesgo y de fácil acceso.
- Estos hallazgos subrayan la necesidad de diseñar políticas públicas integrales y contextualizadas, que aborden los determinantes sociales y contextuales del consumo y no se limiten al enfoque individual.
- Entre las limitaciones del estudio: se excluye información sobre personas institucionalizadas y en situación de calle.

Palabras claves: Drogas ilícitas, Factores sociodemográficos, Factores contextuales.

Referencias

- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). World Drug Report 2023: Executive Summary. 2023 [Internet]. [citado el 27 de octubre de 2023]. Disponible en: https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_Exsum_fin_DP.pdf.
- Narváez N, Rivero M, Guerra E. Determinantes sociales en el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios en 2016. Enfermería: cuidados humanizados [Internet]. 2018. [Citado el 02 de noviembre de 2023]; 7(2): 12-35; Doi: <https://doi.org/10.22235/ech.v7i2.1644>
- Scoppetta O, Avendaño Prieto BL, Cassiani Miranda C. Factores Individuales Asociados al Consumo de Sustancias Ilícitas: Una Revisión de Revisiones. Rev Colomb Psiquiatr [Internet]. 2022. [citado el 28 de octubre de 2023]; 51(3):206–17
- SENDA, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, XV Estudio Nacional de Drogas en Población General. 2022, principales resultados. [Internet]. 2023 [citado el 09 diciembre del 2023] Disponible en: <https://www.senda.gob.cl/senda-presenta-principales-resultados-del-15-estudio-de-drogas-en-poblacion-general/>

ORGANIZAN

AUSPICIAN